duntadortimbatiadartial

Rabo de Ovelha faux

Vass6R12s096-100



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1254

Rolo de ovelha

如1353

est & des faculles d'harbier de 19 A 130 Etransfartation mi Aunho du Cao? III/4 M2





```
DESIGNATION: Rabo de Ovelha m
CLOS VI PLANCHE 13 RANG S Souche3
Vigueur: 4
FORT : érig - derig - couché
Hillerandage : 0
Date de Véraison :
Date de Naturité: 24,9,84 X
Pourriture : 0 14
GRAPPE : G - (1) - P : L - N - (6)
BAIE : TG - G - M - P 17α17
  disc. - Sph. - ell. - ov. -
     obov. - cyl. - fus.
COULDUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVUUR : s - m - ar - fox - herb.
          CHARGE :
s19
s2 10 avec pépins - apyrène
84 8
      JUS inc. - coloré
s5 2
```

```
CLOS TRANG 13 Souche S 3
Désignation: Rabo de Ovelha
CHARGE :
              Année :
             28.7.86
Véraison :
             8-9-86
Maturité :
Mill.: 0
              Pour. : O
GRAPPE : G - M P - Dim. : 14
L - M - (C)
Vigueur :
PORT : érig - 1/2 érig - couché
BAIE : Année :
TG - G - M - P - Dim.: 47
disc - sph -ell. -ov. -obov. -cyl. -fus.
COULEUR : B) - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
       Avec pépins - apyrène
s1 16
s2 A
        JUS ( inc. )- coloré
s3 6
54 12
s5 9
```

```
Rabo de Ovelha faux ni
CLOS WI RANG 13 Souche 53
Désignation :
             Année :
CHARGE :
            10.8
Véraison :
Maturité: 14.9.87
              Pour. : O
Mill.: 0
GRAPPE : G - (M) - P - Dim. : 14
L - M -(C)
Vigueur : 2
PORT : érig - 1/2 érig - (couché)
BAIE : Année :
TG - G - (M) - P - Dim. :17
disc sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
sl 2 Avec pépins - apyrène s2 2
       JUS inc. - coloré
s3 -
54 -
s5 _
```

dentedambedented

	! Nombre	DATES							
	! Total ! d'yeux	26.3	! 29.5 .	12-41	1	1			
1	1 6	: 2	13 .	1 3. 1		1			
2	1 10	! 0	1 2	5.	i	!			
3	1 8	2	! 3	4.	<u>1</u>	i			
4	6	: 1	2	6	1	0			
5	8	1 0	1 1	4	1	1			

Dle 2.4-89

Année: 1985
Emplacement. VII 13 83 Désignation. Rabo de Ovelha

	Nombre	DATES						
	! Total ! d'yeux	87.3	2-4.	1	1 1			
1	8	! 1	5.	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!			
2	1 10	1 1	18, 1	1	1 1			
3	: 6	: 1	1 4 . !	1				
4	1 6	1 0	1 3 . 1	1				
5	1 10	! 0	5.	!				

duntindomindominduntind

ANNEE 1989
NOM Rabo de Gwelha EMPLACEMENT TII 13 S 3
nii 6 R 12 4 96 2

6 R12 A 96 NO

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	oraisc mi/f	4	Vé début	raison mi/v		Maturité
- p-	10	13,3	16.3×	8								
3	6	10,3	16.3× 13.3× 13.3×	5	8,5	23,5	26.5	30.5	4,8	10,8	M.8	
4	8	13,3	16.3×	6	,		-4			+3		
de Langue Victor en de la Colonia	40	le 15.	16,34	-3								

Mill:

Pourriture: Port: Mi'enge' Vigueur: 3

olootoo lootaalaatuuluutuul

DESIGNATION: Ralo do ovelha EMPLACEMENT: VII 4353 2.2

# (A) BOURGEONNENENT

#### Colonne

41 - épanoui O- moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 5 - autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées O- en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses de la duveteuses 6 duveteuses 8) - cotonneuses 9.
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 63- entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85

Désignation : Ralo de ovelha transparent : VII 1353 MARIO DE 2.2

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

4

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 67 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 0 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINACE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 💭

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

#### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

nhantanlantanlantaulindaul

Désignation: Rolv de ovelha Emplacement: 11353

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - noeuds

: verte ()- jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille

rouge foncé 4. intermittentes 6,

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8)

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) longue 4 - très longue 5.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9. Calvo 85

#### Formulaire de description 4/8 (entre nouaison et véraison)

Année: 1998

Observateur: Lecombe

Code cépage

Code clone Nom cépage: Rabo de ovelha (faux)

Emplacement: 6 R12 & 96\_ 100

#### Feuille adulte

oiv 065 taille: très petite 1 - petite 3 - moyenne 5 - grande 7 - très grande 9. oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale/3)- orbiculaire 4 - réniforme 5 oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois(2) - cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 3- vert foncé 7. oiv 070 pigmentation anthocyanique nervures face supérieure limbe : nulle 1)- point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4 oiv 071 pigm. antho. nerv. face inf. limbe: nulle 1)- point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 072 gaufrure limbe (entre nervures II et III) : absente I - présente (9) pur foir oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I et II) : absente 1) - présente 9 oiv 074 profil : plan 1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 oiv 075 cloqure face supérieure limbe : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 3 - forte 1 très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7)- très forte 9. oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1) faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5)- forte 7 - très forte 9. oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1)- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 087\* densité poils dressés face inférieure nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente (1)- présente 9

# Pétiole

oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1 - présente 9

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible 1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane : beaucoup plus court 1 - plus court 3- égal 5 plus long 7 - beaucoup plus long 9.

Densité poils couchés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7

Densité poils dressés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7

Couleur du pétiole : vert 178 - partiellement coloré (177) - coloré 176.

Nº d'ordre : Désignation: Emplacement: Rabo de Overha 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions:  $43 \times$ 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.) 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Hoyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 45 x 45 ). 27 - De couleur blanc (1)- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière ()- irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9. 29 - A section transversale : régulière 3 / irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (1/- coloré 2. 33 - A peau fine (3)- moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutro (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins (8) - apyrène 9 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6)- long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

4

Calvo 85

#### Formulaire de description 5/8 (maturité)

Année : 1999

Code cépage: Code clone: Nom cépage: Rabo de ovelha (fare)

Observateur

Emplacement: 6 R12136.100

#### Grappe

```
oiv 202 longueur: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) (5)-longue
(20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9.
oiv 203 largeur: très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 5 large (15-
20cm) 7 - très large (>20cm) 9.
oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5/- compacte 7 - très compacte 9.
oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm) 5 ) long (7-
10cm) 7 - très long (>10cm) 9.
oiv 207 lignification du pédoncule : base seulemen D- moitié 5 - plus de la moitié 7.
oiv 208* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale(2)
oiv 209* présence d'un aileron : absent 1 - une aile 2 - deux ailes 3) plus de deux ailes 4
```

#### Baie

```
oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 longue
(20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9.
oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5) large (20-
26mm) 7 - très large (>26mm) 9.
oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3).
oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3) - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 -
cylindrique 7 - arquée 8.
oiv 225 couleur épiderme : vert jaune (1) rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6.
oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2)
oiv 227 pruine: nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5)- forte 7 - très forte 9.
oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 épaisse 7 - très épaisse 9
oiv 229 ombilic : peu apparent 1)- apparent 2.
oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée D- colorée 2.
oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée 1)- coloration faible 3 - coloration moyenne 5 -
forte coloration 7 - très forte coloration 9.
oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2)
oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7
oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenné 5)- élevée 7 - très élevée 9.
oiv 236 saveur : aucune (I)- goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5
oiv 236* saveur : aucune 1)- goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4.
oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5 - long
(12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.
oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9
oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3.
oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 longs 7 - très longs 9.
oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 -
moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.
oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes(1)- présentes 2
```

# uluntind pritordointuuluutinul

# Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année: 1999

Code cépage: m Code clone: Nom cépage: Rabo de Ovelha p.R.

Observateur

Emplacement: 6 Ruz A 96. 100

#### Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique(3) aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1)- côtelée 2 - striée 3

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles: absentes T) présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence 1)- présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence 1 présence 9

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5)-

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5) grand

(14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

#### Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

# Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens(2) - saillants 3

signen 4 prime 2

N° d'ordre: Rabo de ovelha je Emplacement: 6 R12 196-100

: 1 -(2) - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - 8 - 9  $L_1/L$ : 10 - (11) L2/L : (12) - (13) - (14) - 15 - 16 Nombre de lobes : (7) - (18) - (19) - 20 Prof. sinus latéral Sup. Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - (32) - (33) - (34) - 35 - 36 - 37 - 38 - (39) Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : (40) - 41 Dents : forme : (42) - 43 - 44 Dents (angle) : 45 - 46 - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 : 51 - 52 - 63 - 64 - 55 - 56 - 57 - 58- 59 Nbre dents du point pét. à L3 : (60) - 61 - 62 Angle des nervures L3 L'3 : 63 - 64 - (65) - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Romes 92